

KIŚCIEC ŻÓŁTOSTERNY

łac. *Lophura erythrophthalma*, Raffles, 1822




WYSTĘPOWANIE

Malezja, Sumatra, Indonezja, Borneo

POKARM

owady, drobne kręgowce, owoce, zielone części roślin, ziarna



47-50 cm

24-25 cm

ok. 1 kg



SAMIEC MÄNNLICH/MALE

DŁUGOŚĆ CIAŁA KÖRPER LÄNGE/BODY LENGTH
DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA BLATTLÄNGE/WING LENGTH
MASA CIAŁA GEWICHT/WEIGHT

42-44 cm

20-22 cm

ok. 0,8 kg



SAMICA WEIBLICH/FEMALE



foto: John Corder

(PL) KIŚCIEC ŻÓŁTOSTERNY

Zamieszkuje wiecznie zielone gęste lasy tropikalne do wysokości 900 m n.p.m. Jest słabo poznanym bażantem, uważany jest za gatunek narażony na wyginięcie. Przyczyniają się do tego pożary oraz wycinka lasów na szeroką skalę, która fragmentuje ich naturalne siedliska. Kiściec żółtosterny to rzadko występujący ptak w hodowlach na całym świecie. Według stanu na 2015 r. nie występowały w żadnym europejskim ogrodzie zoologicznym.

(DE) GELBSCHWANZFASAN

Er bewohnt immergrüne dichte Tropenwälder bis zu einer Höhe von 900 m ü.M. Über diesen Fasanen ist wenig bewusst, er gilt als eine Art, die vom Aussterben bedroht ist. Der Grund davon sind Brände und groß angelegte Fällen von Wälder, was seine natürliche Umwelt verheert. Der Gelbschwanzfasan ist ein selten gezüchteter Vogel. Nach den Daten aus dem Jahr 2015 war er in keinem europäischen Zoo zu finden.

(EN) CRESTLESS FIREBACK

The crestless fireback lives in ever-green dense tropical forests up to an altitude of 900 m above sea level. Little is known about this pheasant, it is considered to be a species at the risk of extinction. Fires and large-scale forest felling fragment its natural habitats. The crestless fireback is a rare bird in breeding all over the world. As of 2015, they were not to be found in any European zoo.