

# KULON


łac. *Burhinus oedicnemus*, Linnaeus, 1758



MAŁE  
RYZYKO  
WYGINIĘCIA

## WYSTĘPOWANIE

południowo-zachodnia i wschód-  
nia Europa, Bałkany, Kaukaz,  
północna Afryka i środkowa Azja



## POKARM

owady, pasikoniki, chrząszcze,  
drobne ślimaki, dżdżownice

40-45 cm  
75-85 cm  
0,35-0,5 kg



SAMIEC MÄNNLICH/MALE



DŁUGOŚĆ CIAŁA KÖRPER LÄNGE/BODY LENGTH  
ROZPIĘTOŚĆ SKRZYDEŁ FLÜGELSPANNWEITE/WINGSPAN  
MASA CIAŁA GEWICHT/WEIGHT

40-45 cm  
75-85 cm  
0,35-0,5 kg



SAMICA WEIBLICH/FEMALE



## (PL) KULON

Kulony zamieszkują nieużytki, piaszczyste wydmy, wrzosowiska, oraz suche, porośnięte ubogą roślinnością tereny sąsiadujące ze starorzeczami. Najbardziej aktywne są od zmierzchu do świtu, ale aktywność w ciągu dnia też nie należy do rzadkości, choć łatwiej je usłyszeć niż zobaczyć. Gniazda zakładają w płytowych zagłębiach w ziemi, w miejscach otwartych oraz ubogich w roślinność, zapewniających dobrą obserwację otoczenia. W Polsce do niedawna był to gatunek lęgowy.

## (DE) TRIEL

Er bewohnt Ödländer, Sanddünen, Heiden, sowie trockene Gebiete mit lichter Vegetation, die an Altwasserseen liegen. Er ist von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen am aktivsten, aber Tätigkeit während des Tages ist auch keine Seltenheit, obwohl er leichter zu hören als zu sehen ist. Das Nest baut er in flachen Senkungen im Boden an offenen und Vegetationsarmen Orten, die gute Beobachtung der Umgebung gewährleisten. Bis vor kurzem war es eine Brutart in Polen.

## (EN) EURASIAN STONE-CURLEW

The Eurasian stone-curlew inhabits wastelands, dunes, heath, as well as dry areas with little vegetation by oxbow lakes. It is mostly active from dusk to dawn, but daytime activity is also not uncommon, although the bird is easier heard than seen. The Eurasian stone-curlew builds nests in shallow depressions in the ground, in open places with poor vegetation providing good observation of the surroundings. Until recently, it was a breeding species in Poland.